

A. ÖYKÜ

1. KİLO VE BOY

- Boy cm. Kilo kg
- Son 6 aydaki kilo kaybı kg., %
- Son 2 haftada kilodaki artış/ azalma/değişiklik yok: kg., %

2. BESİN ALIMINDA DEĞİŞİKLİK

- Yok
- Var : Son gün/ haftadır

- Son beslenme şekli:
- suboptimal katı diyet:
 - hipokalorik sıvı:
 - vitamin ve mineral desteği:
 - hiç alım yok:
 - diğer

3. SON 2 HAFTADIR DEVAM EDEN GASTROİNTESTİNAL SEMPTOMLAR

- Yok:
- Bulantı:
- Kusma:
- Diare:
- İstirahat sırasında ağrı var
- yemek yerken ağrı - var

4. FONKSİYON KAYBI

- Yok
 - Var: Son gün/ haftadır.
- Son fonksiyon durumu:
- Suboptimal çalışıyor
 - Hareketli ama çalışmıyor
 - Sürekli istirahatte

5. PRİMER TANI VE BESLENME İHTİYACI İLE İLİŞKİSİ

-Primer tanı:

- Metabolik stres: -yok
- düşük:
- orta
- şiddetli:

B. FİZİK MUAYENE

(0- normal, 1: hafif kayıp, 2: belirgin kayıp)

- Ciltaltı yağ kaybı:
- Kas erimesi:
- Ödem:
- Asit:
- Mukozal lezyonlar:
- Cilt ve saç değişiklikleri:

C. SGA PUANLAMASI

- A-Normal beslenme
- B-Malnütrisyon riski/ orta malnütrisyon
- C-Şiddetli malnütrisyon

REFERANS

Detsky AS, et al. JPEN 1987;11:8-13